

## **Referenzliteratur für das Gebiet - Steinfeld**

- BIERINGER G. & SAUBERER N. (2001): Feuer - Entwertung oder Erneuerung der Großmittler Trockenrasen? In: Bieringer G., Berg H.-M. & Sauberer N. (Hrsg.): Die vergessene Landschaft. Beiträge zur Naturkunde des Steinfeldes. Stapfia 77: 243-249.
- BIERINGER G. & ZULKA K.P. (2001): Die ökologischen Folgen von Aufforstungen im nördlichen Steinfeld. In: Bieringer G., Berg H.-M. & Sauberer N. (Hrsg.): Die vergessene Landschaft. Beiträge zur Naturkunde des Steinfeldes. Stapfia 77: 251-259.
- BIERINGER G., BERG H.-M. & SAUBERER N. (2001): Ein Leitbild für ein Natura 2000-Gebiet „Steinfeld“. In: Bieringer G., Berg H.-M. & Sauberer N. (Hrsg.): Die vergessene Landschaft. Beiträge zur Naturkunde des Steinfeldes. Stapfia 77: 305-313.
- BIERINGER G. & BERG H.-M. (1995): Steinfeld. In Dvorak M & Karner E.: Important Bird Areas in Österreich. Monographien Band 71. Umweltbundesamt, Wien: 110-120.
- BIERINGER G. & BERG H.-M. (2001): Die Heuschreckenzönosen (Orthoptera) des zentralen Steinfeldes im Vergleich mit ausgewählten Trockenrasen des pannonischen Raums in Ostösterreich. In: Bieringer G., Berg H.-M. & Sauberer N. (Hrsg.): Die vergessene Landschaft. Beiträge zur Naturkunde des Steinfeldes. Stapfia 77: 175-187.
- BIERINGER G. & SAUBERER N. (2001): Der Naturraum Steinfeld. In: Bieringer G., Berg H.-M. & Sauberer N. (Hrsg.): Die vergessene Landschaft. Beiträge zur Naturkunde des Steinfeldes. Stapfia 77: 9-27.
- BUCHNER P. (1976): Primäre und sekundäre Trockenrasen des Wiener Neustädter Steinfeldes. Hausarbeit Universität Wien, Wien. 64 pp.
- DVORAK M. & KARNER, E. (1995): Important Bird Areas in Österreich. Umweltbundesamt, Monographien 71.
- DVORAK, M.; ELLMAUER, T. & SACHSLEHNER, L. (2002): Erhaltungsziele in den Natura 2000-Gebieten Niederösterreichs. Studie im Auftrag des Landes Niederösterreich, 217 pp.
- ELLMAUER, T. & TRAXLER, A. (2001): Handbuch der FFH-Lebensraumtypen Österreichs. Monographie des Umweltbundesamtes 130, 208 pp.
- ESSL, F.; DVORAK, M.; ELLMAUER, T.; KORNER, I.; MAIR, B.; SACHSLEHNER, L & VRZAL, W. (2001): Flächenscharfe Erhebung, Bewertung und GIS-Implementierung der gemäß den Richtlinien 79/409/EWG und 92/43/EWG zu schützenden Lebensräume in den von Niederösterreich nominierten Natura 2000-Gebieten. Endbericht. Studie im Auftrag des Amtes der NÖ Landesregierung.
- FARASIN K., SCHRAMAYR G., GRÜNWEIS F.M., HAUSER M., KALTENBACH A., TIEDEMANN F. & PROKOP P. (1989): Biotoperhebung Truppenübungsplatz Großmittel. Dokumentation des Zustandes und Diskussion über Entwicklungsmöglichkeiten der naturräumlichen Ausstattung eines militärischen Sperrgebietes. Monographien Bd. 10. Umweltbundesamt, Wien. 139 pp.
- FISCHER R. (1961): Verborgene Schönheiten einer vergessenen Landschaft - Die Steppenheiden des Steinfeldes. Universum (Wien) 16: 415-424.
- FISCHER R. (1995): Blütenpracht am Ostsaum der Alpen. Edition Tau, Bad Sauerbrunn. 382 pp.
- HOLZNER, W. (Hrsg.) (1986): Österreichischer Trockenrasenkatalog. Bundesministerium f. Gesundheit u. Umweltschutz, Grüne Reihe 6.
- HOLZNER W. (1973): Die Ackerunkrautvegetation Niederösterreichs. Mitteilungen der botanischen Arbeitsgemeinschaft am oberösterreichischen Landesmuseum Linz 5(1): 1-157.
- LACON (2001): Landschaftscharakteristik und naturschutzfachliche Ziele, Bericht im Rahmen des Kulturlandschaftsprojektes Würflach
- LACON (2001): Landschaftsplan Schönau a.d. Triesting, Bericht im Rahmen des Kulturlandschaftsprojektes Schönau a. d. Triesting
- MALICKY H. (1969): Vegetationsprobleme des Wiener Neustädter Steinfeldes. Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 108/109: 151-163.

- MALICKY H. (1972): Vergleichende Barberfallenuntersuchungen auf den Apetloner Hutweiden (Burgenland) und im Wiener Neustädter Steinfeld (Niederösterreich): Spinnen (Araneae). *Wiss. Arbeiten Bgld.* 48: 109-123.
- MALICKY H. (1975): Vergleichende Barberfallenuntersuchungen auf den Apetloner Hutweiden (Burgenland) und im Wiener Neustädter Steinfeld (Niederösterreich): Hummeln (Apidae), Orthoptera, Chilopoda und Vertebrata. *Biologisches Forschungs- institut Burgenland Bericht* 8: 1-13.
- MALICKY H. (1977): Vergleichende Barberfallenuntersuchungen im Wiener Neustädter Steinfeld (Niederösterreich) und auf den Apetloner Hutweiden (Burgenland): Zikaden (Homoptera Auchenorrhyncha). *Ber. Arbeitsgem. ökol. Ent. Graz* 8: 23-32.
- PAAR, M.; SCHRAMAYR, G.; TIEFENBACH, M. & WINKLER, I. (1993): Naturschutzgebiete Österreichs. Band 1: Burgenland, Niederösterreich, Wien. Umweltbundesamt, Monographien 38 A.
- RABITSCH W. (2001): Zur Wanzenfauna (Insecta, Heteroptera) im nördlichen Steinfeld. In: Bieringer G., Berg H.-M. & Sauberer N. (Hrsg.): *Die vergessene Landschaft. Beiträge zur Naturkunde des Steinfeldes.* *Stapfia* 77: 159-173.
- ROTTER S. & ZULKA K.P. (1999): Bemerkenswerte Laufkäfer-Nachweise aus dem Steinfeld (Niederösterreich, südliches Wiener Becken) (Coleoptera: Carabidae). *Koleopterologische Rundschau* 69: 19-24.
- SAUBERER N. & BIERINGER G. (2001): Wald oder Steppe? Die Frage der natürlichen Vegetation des Steinfeldes. In: Bieringer G., Berg H.-M. & Sauberer N. (Hrsg.): *Die vergessene Landschaft. Beiträge zur Naturkunde des Steinfeldes.* *Stapfia* 77: 75-92.
- SAUBERER N. & BUCHNER P. (2001): Die Trockenrasen-Vegetation des nördlichen Steinfeldes. In: Bieringer G., Berg H.-M. & Sauberer N. (Hrsg.): *Die vergessene Landschaft. Beiträge zur Naturkunde des Steinfeldes.* *Stapfia* 77: 113-128.
- SAUBERER N. (2001): Die Flora (Farn- und Blütenpflanzen) des Steinfeldes unter besonderer Berücksichtigung des militärischen Sperrgebietes Großmittel. In: Bieringer G., Berg H.-M. & Sauberer N. (Hrsg.): *Die vergessene Landschaft. Beiträge zur Naturkunde des Steinfeldes.* *Stapfia* 77: 129-146.