

INFORMACIONA LISTA ZA LICA OBOLELA OD TUBERKULOZE

Tuberkuloza je zarazna bolest uzrokovana bakterijama. Prenosi se kapljičnom infekcijom. Uzroci bolesti povezani sa vrlo sitnim kapljicama prenose se kašljanjem, kihanjem ili govorom u vazduhu tako da ih drugi ljudi mogu udahnuti. Pošto lečenje traje duže od većine drugih zaraznih bolesti i da najmanje pola godine potrebno za uzimanje više lekova, oni kod kojih postoji sumnja da imaju tu bolest moraju se podvrgnuti testiranju, a obolela lica lečenju.

1. Opasnosti povezane sa lečenjem za Vas i Vašu okolinu:

Za lečenje Vaše bolesti morate uzimati više lekova (antibiotika) redovito duži vremenski period (najmanje 6 meseci). Neredovito uzimanje nedovoljne količine antibiotika može sprečiti izlečenje i dovesti do opasne rezistencije, što znači da će tada biti dostupan mali broj lekova, od kojih neki imaju neželjene efekte.

2. Uputstvo i obaveze za odgovarajuće ponašanje:

Razmislite o sledećim principima kako biste zaštitili svoju porodicu i lica u svojoj okolini od infekcije:

U prvih nekoliko sedmica bolesti, dok još postoji rizik da se neko od vas zarazi, morate se pridržavati sledećih higijenskih mera:

- Prilikom kašljanja ili kihanja ispred usta stavite čistu papirnatu maramicu.
- Ako morate ispljunuti, ispljunite u papirnatu maramicu.
- Korištenu papirnatu maramicu odmah bacite u smeće.
- Za jelo i piće koristite sopstveni pribor koji ćete sami oprati u čistoj vodi. U toj vodi za pranje niko drugi ne sme da pere svoje posuđe za jelo. Mašina za pranje sudova treba da pere na najmanje 60°C (program za lonce BEZ tastera za štednju energije).
- Izbegavajte telesni kontakt sa decom i starijim licima, ne ljubite se.
- Više puta dnevno dobro provetrite sobu u kojoj boravite.
- Zbog sopstvenog interesa pridržavajte se uputstava lekara koji Vas leči odn. Centra za savetovanje i testiranje tuberkuloze. Time se omogućava brže izlečenje.

- Nakon puštanja iz bolnice ostanite u redovitom kontaktu sa svojim Centrom za savetovanje i testiranje tuberkuloze odn. sa lekarom koji Vas leči i posetite ih odmah ako primetite da su se javili neželjeni efekti (npr.: nedostatak apetita, osip na koži, mučnina).
- Izbegavajte alkohol jer alkohol utiče na uspeh lečenja odn. na proces lečenja, jetra je već opterećena lekovima.
- Ako morate da posetite lekara ili bolnicu zbog neke druge bolesti obavestite ih da bolujete od tuberkuloze i da se lečite.

3. Od Vas se traži

- da se lečite
- da se podvrgnete neophodnim testovima
- da lokalnim organima uprave date sve informacije
- da pratite uputstva lokalnih organa uprave

Prema čl. 2, 6 st. 3 i 4 te 7 st. 1 i 3 Zakona o tuberkulozi (austrijski Građanski zakon BGBl.127/1968 u aktualnoj verziji)

4. Ukoliko ne pratite uputstva lekara i lokalnih organa, to može imati sledeće posledice:

- U slučaju direktne opasnosti lokalni organ uprave Vas može odmah uputiti u bolnicu. (prema čl. 20 Zakona o tuberkulozi)
- Sud može naložiti zadržavanje uz ograničavanje lične slobode. (prema čl. 14, 15 i 16 Zakona o tuberkulozi).
- Možete biti osuđeni i prema Krivičnom zakonu zbog namernog ugrožavanja opšte sigurnosti (§178 StGB).

Želimo Vam skoro poboljšanje i uvek Vam stojimo na raspolaganju za negu i pitanja.